

## **BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER**

Xatral 2,5, tabletten 2,5 mg

alfuzosinehydrochloride

**Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.**

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Dit geneesmiddel is aan u persoonlijk voorgeschreven. Geef dit geneesmiddel niet door aan anderen. Dit geneesmiddel kan schadelijk voor hen zijn, zelfs als de verschijnselen dezelfde zijn als waarvoor u het geneesmiddel heeft gekregen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

**In deze bijsluiter:**

1. Wat is Xatral 2,5 en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u Xatral 2,5 inneemt
3. Hoe wordt Xatral 2,5 ingenomen
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Xatral 2,5
6. Aanvullende informatie

### **1. WAT IS XATRAL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT**

Xatral 2,5 is een geneesmiddel in de vorm van een tablet dat moet worden ingenomen via de mond.

Xatral 2,5 behoort tot de groep van geneesmiddelen bij prostaataandoeningen, de zogenaamde alfa-1-blokkers. Het geeft een ontspanning van het spierweefsel in prostaat en blaashals, waardoor de urine gemakkelijker uit de blaas kan stromen.

Xatral 2,5 wordt gebruikt voor de behandeling van de klachten van goedaardige prostaatvergroting.

#### Goedaardige prostaatvergroting

De prostaat bevindt zich vlak onder de blaas. De plasbuis loopt vanuit de blaas door de prostaat heen naar buiten. In de prostaat bevindt zich behalve klierweefsel (voor de productie van prostaatvocht) ook spierweefsel. Dit spierweefsel bevindt zich ook in de blaashals. Bij goedaardige prostaatvergroting verkrampst dit spierweefsel in de prostaat en blaashals zich, waardoor de plasbuis wordt vernauwd. Hierdoor kan de urine moeilijker uit de blaas stromen en ontstaan er klachten aan de lagere urinewegen.

### **2. WAT U MOET WETEN VOORDAT U XATRAL INNEEMT**

**Neem Xatral niet in**

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor alfuzosine of voor één van de andere bestanddelen van Xatral 2,5.
- als bij u in het verleden bloeddrukdaling is opgetreden bij het rechtop gaan zitten of staan.
- als u andere alfa-1-blokkers gebruikt.
- als u een ernstige aandoening van de lever heeft.

### **Wees extra voorzichtig met Xatral**

- als u een aandoening van de kransslagaderen heeft. De eventuele behandeling van verminderde aanvoer van bloed naar de hartspier dient te worden voortgezet.
- als klachten van pijn op de borst (angina pectoris) terugkomen of verergeren. Het gebruik van Xatral 2,5 moet worden gestaakt.
- als u op leeftijd bent, als u een verhoogde gevoeligheid voor alfa-1-blokkers heeft of als u tegen hoge bloeddruk wordt behandeld.
- bij bloeddrukdaling bij het rechtop gaan zitten of staan in de eerste uren na inname van de tablet. Dit effect kan eventueel samengaan met verschijnselen zoals: duizeligheid, moeheid of transpireren. In dat geval moet u gaan liggen totdat de verschijnselen geheel zijn verdwenen. Deze verschijnselen zijn gewoonlijk van voorbijgaande aard en kunnen zich aan het begin van de behandeling voordoen. Als regel kan de behandeling worden voortgezet.

*Raadpleeg uw arts indien één van de bovenstaande waarschuwingen op u van toepassing is, of dat in het verleden is geweest.*

### **Inname met andere geneesmiddelen**

Sommige geneesmiddelen kunnen namelijk elkaars werking beïnvloeden of mogen om andere redenen niet gelijktijdig worden gebruikt.

- Gelijktijdig gebruik met andere alfa-1-blokkers dient te worden vermeden.
- Bij combinatie met geneesmiddelen tegen verhoogde bloeddruk kan het nodig zijn om de dosering daarvan aan te passen, vanwege het mogelijk optreden van een bloeddrukdaling.
- Als u een operatie moet ondergaan, moet u de behandelend arts vertellen dat u Xatral 2,5 gebruikt.
- Bij combinatie met nitraten (geneesmiddelen tegen beklemmend pijnlijk gevoel op de borst) kan het nodig zijn om de dosering daarvan aan te passen, vanwege het mogelijk optreden van een bloeddrukdaling.
- Het kan nodig zijn om de dosering aan te passen bij een gelijktijdig gebruik met middelen die het leverenzym CYP3A4 remmen, zoals ketoconazol, itraconazol en ritonavir.

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen.

### **Zwangerschap en borstvoeding**

Niet van toepassing. Xatral wordt alleen voorgeschreven aan mannen.

### **Rijvaardigheid en het gebruik van machines**

Er zijn geen gegevens bekend over het effect op de rijvaardigheid of het gebruik van machines. Klachten zoals duizeligheid of algemene zwakte kunnen zich voordoen. Bij het besturen van voertuigen of het gebruik van machines dient hiermee rekening te worden gehouden.

### **Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Xatral**

Xatral 2,5 bevat lactose. Indien uw arts u heeft meegedeeld dat u bepaalde suikers niet verdraagt,

neem dan contact op met uw arts voordat u dit geneesmiddel inneemt.

### 3. HOE WORDT XATRAL INGENOMEN

Voor oraal gebruik.

Volg bij het innemen van Xatral nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De aanbevolen normale dosering is 1 tablet Xatral XR 10, in te nemen na de avondmaaltijd.

Wanneer u een milde tot matige verminderde werking van de lever heeft dient u tabletten Xatral 2,5 mg te gebruiken. Neem 1 tablet Xatral 2,5 per dag voor het slapen gaan. Neem de tablet met voldoende vloeistof in (bijvoorbeeld een glas water). Uw arts kan deze dosering verhogen tot 2 maal per dag 1 tablet met 2,5 mg ('s ochtends en 's avonds).

Inname van uw tabletten elke dag op hetzelfde tijdstip geeft het beste effect. Het helpt u bovendien te herinneren wanneer u de tabletten moet innemen.

Vaak wordt Xatral 2,5 gedurende een langere tijd voorgeschreven. Uit onderzoek is gebleken dat de werking op langere termijn behouden blijft. Volg hierbij de aanwijzingen van uw arts op.

#### **Wat u moet doen als u meer van Xatral heeft ingenomen dan u zou mogen**

Wanneer u te veel van Xatral 2,5 heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of apotheker.

#### **Wat u moet doen wanneer u bent vergeten Xatral in te nemen**

Het kan voorkomen dat u vergeet een tablet in te nemen. In dat geval is het niet nodig de vergeten tablet alsnog in te nemen. U kunt de volgende dag doorgaan met het innemen van de voorgeschreven dosering.

Neem nooit een dubbele dosis van Xatral 2,5 om zo de vergeten dosis in te halen.

### 4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Xatral 2,5 bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Bijwerkingen kunnen:

- zeer vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 10 patiënten);
- vaak voorkomen (bij meer dan 1 op de 100, maar bij minder dan 1 op de 10 patiënten);
- soms voorkomen (bij meer dan 1 op de 1000, maar bij minder dan 1 op de 100 patiënten);
- zelden voorkomen (bij meer dan 1 op de 10.000, maar bij minder dan 1 op de 1000 patiënten);
- zeer zelden voorkomen (bij minder dan 1 op de 10.000 patiënten,);

#### Zenuwstelselaandoeningen

Vaak: zwakheid, duizeligheid, gevoel van onwelzijn (malaise), hoofdpijn

Soms: slaperigheid

### Oogaandoeningen

Soms: stoornissen in het zien (visusstoornissen)

### Hartaandoeningen

Vaak: bloeddrukdaling door bijvoorbeeld snel opstaan uit een zittende of liggende houding soms gepaard gaande met duizeligheid (orthostatische hypotensie)  
Soms: versnelde hartslag (tachycardie), hartkloppingen (palpitaties), plotseling verlies van bewustzijn (syncope)  
Zeer zelden: beklemmend pijnlijk gevoel op de borst (angina pectoris) bij patiënten met een coronair insufficiëntie

### Ademhalingsstelsel-, borstkas- en mediastinumaandoeningen

Soms: ontsteking van het neusslijmvlies gekenmerkt door een verstopte neus, niezen en afscheiding (rhinitis)

### Maagdarmstelselaandoeningen

Vaak: misselijkheid, buikpijn, diarree, droge mond

### Huid- en onderhuidaandoeningen

Soms: huiduitslag, jeuk  
Zeer zelden: huiduitslag met hevige jeuk en vorming van bultjes (galbulten of urticaria), plotselinge vochtophoping in de huid en slijmvliezen (bijv. keel of tong), ademhalingsmoeilijkheden en/of jeuk en huiduitslag, vaak als allergische reactie (angioneurotisch oedeem)

### Algemene aandoeningen en toedieningsplaatsstoornissen

Vaak: algehele lichamszwakte (asthenie)  
Soms: vochtophoping (oedeem), blozen (flush), pijn op de borst (zie rubriek 4.4).

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

## **5. HOE BEWAART U XATRAL**

Bewaren beneden 25°C.  
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking.

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen

Gebruik Xatral 2,5 niet meer na de datum op de verpakking achter de woorden "niet te gebruiken na" en op de doordrukstrips na "Exp." (Exp. = vervaldatum = niet te gebruiken na).

Wanneer de uiterste gebruiksdatum is verstreken, lever dan de verpakking ter vernietiging in bij uw apotheek.

## **6. AANVULLENDE INFORMATIE**

**Wat bevat Xatral**

- Het werkzame bestanddeel van Xatral 2,5 is alfuzosinehydrochloride 2,5 mg.
- Andere bestanddelen (hulpstoffen) zijn: lactose, microkristallijn cellulose, polyvinylpyrrolidon, natriumzetmeelglycolaat, magnesiumstearaat, methylhydroxypropylcellulose, polyethyleenglycol 400 en de kleurstof titaandioxide (E171).

### **Hoe ziet Xatral er uit en wat is de inhoud van de verpakking**

Xatral 2,5 tabletten zijn rond en wit en zijn verkrijgbaar in verpakkingen met 15 en 90 tabletten.

### **Houder van de vergunning voor het in de handel brengen**

sanofi-aventis Netherlands B.V.  
Kampenringweg 45 D-E  
2803 PE Gouda  
Tel: 0182 55 77 55

**Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in mei 2008**